

۲۸ - الگوریتم pancake sort بر اساس رفتار آشپزها با پن کیک بنا شده است. فرض کنید  $n$  عدد پن کیک بر روی هم قرار گرفته اند و بر روی هر کدام عددی نوشته شده است که قابل روئیت می باشد. تنها کار ممکن فرو کردن کفگیر قبل از یک پن کیک خاص و وارونه کردن همه پن کیک های بالای کفگیر است. این کار را عمل «وارون» می گوییم که می تواند از هر جا انجام شود. هدف از این الگوریتم مرتب کردن صعودی اعداد روی پن کیک ها با استفاده از کمترین تعداد عمل «وارون» است. اگر تعداد  $n \geq 6$  باشد با چه تعداد عمل وارون می توان یقیناً اعداد را مرتب کرد؟ (کمترین گزینه را علامت بزنید).

$$2n - 2 \quad (4)$$

$$2n - 1 \quad (3)$$

$$n - 1 \quad (2)$$

$$n \quad (1)$$

۳۹ - در مورد رابطه بازگشتی زیر کدام گزینه صحیح است؟

$$T(n) = 4T(\sqrt{n}) + 1 \quad T(2) = 1$$

$$T(n) = \frac{4}{3}(n)^2 - \frac{1}{3} \quad (4) \quad T(n) = \frac{4}{3}(\log n)^2 - \frac{1}{3} \quad (3) \quad T(n) = \frac{4}{3}(4^n) - \frac{1}{3} \quad (2) \quad T(n) = \frac{1}{3}(\log n)^2 - \frac{4}{3} \quad (1)$$

۴۰ - حالت خاصی از مسئله برج هانوی را در نظر بگیرید. ۱۰۰ سکه با شماره ها (واندازه های) ۱ تا  $10^0$  موجودند. از این تعداد  $n$  عدد در میله ای شماره ۱ (با شماره های دلخواه) به ترتیب از بزرگ به کوچک (از پایین به بالا)، و بقیه در میله ای شماره ۳ با همین نظم و ترتیب قرار دارند. می خواهیم با حفظ همه مقررات برج هانوی، همه سکه ها را به میله ای شماره ۲ منتقل کنیم. حداقل تعداد حرکت ها در بدترین حالت حرکت سکه ها چند تاست؟

$$2^{101} + 1 \quad (4)$$

$$2^{101} - 1 \quad (3)$$

$$2^{100} + 1 \quad (2)$$

$$2^{100} - 1 \quad (1)$$

۴۱ - در باشگاهی قرار است مسابقات والیبال برگزار شود به این ترتیب که بین  $2^k = n$  تیم شرکت کننده اول  $\frac{n}{2}$  مسابقه صورت می گیرد. سپس بین تیم های برنده و نیز بین تیم های بازنده دوباره به همین شکل مسابقاتی برگزار می شود (در هر مرحله هر تیم برنده با یک تیم برنده دیگر از همان مرحله مسابقه می دهد و همینطور برای تیم های بازنده آن مرحله) و در هر مرحله مسابقات به همین منوال ادامه پیدا می کند تا زمانی که به گروه های یک تیمی برسیم. تعداد کل بازی ها برای  $n = 128$  برابر است با: (نتیجه مساوی نداریم).

$$704 \quad (4)$$

$$576 \quad (3)$$

$$448 \quad (2)$$

$$220 \quad (1)$$

۴۲ - می خواهیم قطر یک درخت آزاد  $G = (V, E)$  (گراف بدون جهت و غیر سیکلی و بدون وزن) را پیدا کنیم. قطر بیشترین فاصله دو گره در گراف است. این کار در بهترین حالت با چه مرتبه ای می تواند انجام شود.



$$O(|V|^3) \quad (4)$$

$$O(|V| \lg |V|) \quad (3)$$

$$O(|V|) \quad (2)$$

$$O(|V||E|) \quad (1)$$

۴۳ - دو گراف زیر و دو پیمایش DFS و BFS روبرو مفروض هستند:



DFS : cbfedha

BFS : cbfedah

۱) این دو پیمایش برای هر دو گراف درست هستند.

۲) این دو پیمایش برای هر دو گراف غلط است.

۳) DFS داده شده برای هر دو درست است ولی BFS فقط برای گراف ۱ درست است.

۴) BFS برای هر دو درست است ولی DFS فقط برای گراف ۲ درست است.

۴۴ - ماتریس B از روی گراف  $G = (V, E)$  به صورت زیر به دست آمده است:

$$b_{ij} = \begin{cases} -1 & \text{اگر بیال } z_j \text{ گره } i \text{ را ترک کند.} \\ 1 & \text{اگر بیال } z_j \text{ به گره } i \text{ وارد شود.} \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

ماتریس  $C = B \cdot t_B$  (ترانهاده B است) چه را نشان می دهد؟ می توان:

۱) با مقدار  $c_{ij}$  تعداد دوره های بین گره های  $v_i$  و  $v_j$  را تعیین کرد.

۲) با مقدار  $c_{ij}$  تعداد بیال های از  $v_i$  و  $v_j$  را تعیین کرد.

۳) با مقدار  $c_{ij}$  تعداد بیال های از  $v_i$  و  $v_j$  را تعیین کرد.

۴) با مقدار  $c_{ij}$  تعداد بیال های بین گره  $i$  و  $j$  را تعیین کرد.